

- водене на регистър на всички работници, пряко заети в производствения процес;
- незабавно да сигнализират на обслужващия ветеринарен лекар и на най-близкия държавен ветеринарен лекар за завишена заболяемост или смъртност при отглежданите от тях птици.

Ловци, дивечовъди, биолози, еколози и други, имаци отношение към дивите и свободно живеещите птици, трябва незабавно да предприемат следното:



- да уведомяват ветеринарно-медицинските специалисти за промяна в поведението на птиците и забелязана смъртност сред тях;
- да ползват предпазни средства и да спазват лична хигиена при контакти с умрели птици и такива с променено поведение.

Стопани!

При каквото и да е заболяване на вашите птици следвайте следното:

- Уведомете незабавно ветеринарния лекар или кмета!
- Избягвайте прекия контакт с живи домашни птици или диви птици!
- Избягвайте прекия контакт с повърхности, замърсени с птичи екскременти!
- Не пипайте умрели птици с голи ръце!
- Не посещавайте пазари за живи животни и птицеферми!

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ПТИЧИЯ ГРИП?

Какво представлява?

ИНФЛУЕНЦАТА или ГРИП при птиците е остро заразно заболяване с почти 100 % заболяемост и смъртност.

Как се проявява при птиците?


Заболяемите от инфлуенца птици са с разрошени пера, омърлушени, липсва апетит, установява се намалено яйценосене, посиняване и оток на гребена и менгушите или цялостен оток на главата. Проявяват тежки увреждания на дихателната система - кихане, кашлица, хрипове, изтечения от очите, диария, нервни признаци, парализа и смърт.



Пилета, заболяели от птичи грип с оток на главите.

Как се разпространява?

- Болестта се съхранява и пренася от дивите прелетни птици, които ежегодно мигрират. Те не бодеуват, а само пренасят причинителя.
- Предаването на инфекцията става чрез директен контакт със заразени птици или птици продукти.
- Поради това, че вирусът може да живее кратко в околната среда, разяването се осъществява основно чрез контакт с повърхности, прах и др., само ако същите са били прясно заразени (екскременти и респираторни секрети, термично необработени месо или кръв).
- При контакт и ползване на едни и същи водоеми с домашните водоплаващи птици причинителят се предава от дивите прелетни птици на домашните водоплаващи.
- При отглеждане на заразени домашни водоплаващи, същите могат да пренесат болестта на кокошки и пуйки, които заболяват и смъртността при тях може да достигне 100 %.
- При контакт със заболяли птици и неспазване на личната хигиена могат да заболяят стопаните или членовете на техните семейства.
- Един от пътищата на разпространение на заболяването е неправилното обезвреждане на отпадъците при оплозотворяване на пернат дивеч.



Как се диагностицира?

Диагноза може да се постави само след лабораторни изследвания!

Как да се предотврати?

Стопаните, които отглеждат птици в личния двор, трябва да следват строго следните правила:

- Да не пускат извън двора си по улиците домашните птици, а водоплаващите - във водоеми, обитавани от диви и диви прелетни птици.
- По възможност да отглеждат раздвоено в двора си водоплаващите от другите видове птици.
- При непосредствена опасност от заболяване да отглеждат птиците си в затворени помещения, за да няма контакт с други свободно живеещи птици (врабчета, гъбци и т.н.).
- При поява на каквото и да е заболяване или умирање на птици, стопанинът е длъжен незабавно да уведоми обслужващия го ветеринарен лекар или кмета на населеното място.
- Да не се пипат заболяли и умрели птици с голи ръце, а само с предпазни средства. Да не се допускат деца до тях!

Собствениците и управителите на промишлени птицевъдни ферми трябва да спазват общите ветеринарно-санитарни мерки, които включват:

- Дезинфекция на влизачи и излизачи превозни средства във фермите;
- забрана за влизане на външни лица във фермите;
- ползване на „мокри“ филтри от персонала пряко зает в производствения процес;
- ползване на лични предпазни средства от персонала, пряко зает в производствения процес;
- предпазване на фуражните суровини и готовия фураж от контакт със свободно живеещи птици;



ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- Почистването и дезинфекцията са едни от най-важните изисквания за предотвратяване възникването на заразно заболяване при вашите птици!
- Преди да дезинфекцирате превозни средства; оборудване; дрехи, обувки и т.н., предварително трябва да бъдат добре почистени с вода и сапун!

ДЕЗИНФЕКТАНТИ

Продукт	Работни концентрации и необходимо кон- тактно време	Начин на приготвяне на работен разтвор	Подходящ за:
5,25 % натриев хипохлорид (домашна белина)	3 %, 2 часа	13,5 литра белина + 9 литра вода	Повърхности, животновъдни помещения, превозни средства, облекло, ръце, обувки, дезинфекционни вани
Оцетна киселина	4-5 %, 4 часа	168 гр. ледена оцетна киселина + 4,5 литра вода	Повърхности, животновъдни помещения, превозни средства, облекло, ръце, обувки, дезинфекционни вани
Натриев карбонат (сода, пепел)	4 %, 4 часа	150 гр. натриев карбонат + 4,5 литра гореща вода	Повърхности, животновъдни помещения, превозни средства, дезинфекционни вани
Натриев хидроксид (NaOH)	2 %, 2 часа	1/3 водна чаша натриева основа към 4,5 литра вода	Повърхности, животновъдни помещения, превозни
Вар – гасена (CaOH2) Вар – негасена (CaO)	Прах Гранула	Прибавя се неразредена	Твърд оборски тор, птища, почва средства, дезинфекционни вани


НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ! ВИЕ СТЕ НАЙ - ДОБРАТА ЗАЩИТА ЗА ВАШИТЕ ПТИЦИ !



КАК ДА ЗАЩИТИТЕ ПТИЦИТЕ СИ? ШЕСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ПТИЦИ!


Избягвайте контакти с други птици!

- Забранете достъпа до вашите птици!
- Дръжте птиците си затворени!
- Не позволявайте контакти с външни лица, освен тези, които се грижат за Вашите птици!
- Не позволявайте достъп на външни посетители, които също отглеждат птици!
- Не позволявайте контакт с диви птици, защото те може да са евентуален източник на заболяване!
- Извършвайте контрол на гризачите!



Поддържайте чистота!

- Винаги носете чисти дрехи!
- Почиствайте обувките си с дезинфектант преди да влезете в помещението за птици!
- Почиствайте ръцете си с вода, сапун и дезинфектант преди да влезете в помещението за птици!
- Цялото необходимо оборудване преди да се използва в помещението за птиците трябва да бъде правилно почистено и дезинфекцирано!
- Отстранете тора преди да извършите дезинфекцията!
- Трупите на мъртви птици да бъдат обезвредени!



Не пренасяйте заболяването в Дома си!

- Ако в близост до Дома Ви се отглеждат други птици, почиствайте превозните средства и оборудването винаги преди да се върнете във вкъщи!
- Ако Вашите птици са били на изложба или на пазар за птици трябва да ги държите изолирано за период от 2 седмици от останалите птици в Дома Ви!
- Ново закупените птици трябва да бъдат карантинирани за период от 30 дни!
- За да предотвратите поява на болести по птиците най-добре е да отглеждате отделно различните категории птици и те да бъдат разделени по възрастови групи!



Не внасяйте заболявания от Вашите съседи!

- Не използвайте едновременно и същото оборудване (хранилки, поилки и т.н.) с Вашите съседи!
- Ако не разполагате със собствено оборудване винаги преди употреба извършвайте цялостно почистване и дезинфекция на оборудването, което ще използвате!



Разпознаване на симптомите на заразните болести по птиците

Много заболявания по птиците са трудни за диагностика. Ранното откриване на болестта позволява предотвратяване на разпространението ѝ. По-долу са посочени някои основни моменти, които насочват, че нещо се случва с Вашите птици:

- Внезапно увеличаване на смъртността на птиците;
- Диария;
- Намаляване или напълно спиране на яйценосенето;
- Умьрушеност, задух, изтечения от носа;
- Загуба на енергия и апетит;
- Отоци около очите и врата;
- Мораво оцветяване по гръбена, ментушите и краката;
- Депресия, тремор на мускулатурата, увисване на крилата; изкривяване на главата и врата; загуба на координация; пълна парализа.



Сигнализиране за болни птици!

НЕ ЧАКАЙТЕ, А СИГНАЛИЗИРАЙТЕ НЕЗАБАВНО !!!

- Ранното откриване на заболяемите птици предотвратява разпространението на болестта!
- Ако откриете промени в здравословния статус на Вашите птици или неочаквана смъртност незабавно трябва да уведомите ветеринарния лекар, обслужващ обекта или кмета на населеното място!

